



3. Vervolg vragenlijst SOA-triage (in te vullen door patiënt samen met assistente/huisarts)

Naam patiënt: _____
Geboortedatum: _____

9. Wat is de reden waarom u een SOA-onderzoek aanvraagt? (meerdere antwoorden mogelijk):

Antwoord gegeven bij vraag 1:

- Ik ben bezorgd een SOA te hebben, omdat _____
- Ik ben gewaarschuwd omdat mijn sekspartner een SOA heeft, namelijk _____
- Mijn zorgverlener denkt dat ik een SOA kan hebben, omdat _____

Aanvullend:

- Ik heb klachten, namelijk (vul cijfers in van de klachten hiernaast): _____
- Mijn partner heeft klachten, namelijk (vul cijfers in van de klachten hiernaast): _____
- Ik kom voor een periodieke controle voor _____
- Ik erken dat ik risicogedrag laat zien, namelijk _____
- Ik merk dat mijn partner risicogedrag vertoont, namelijk _____
- Ik een nieuwe relatie heb / mijn relatie heb beëindigd.
- Mij seksueel geweld is aangedaan. (Datum/periode: _____)
- Ik ben onzeker, angstig en ongerust, omdat _____

Vrouwen/mannen

- 1 pijn of branderig gevoel bij plassen
- 2 kleine beetjes plassen
- 3 pijn bij/na vrijen
- 4 pijn/steken onderbuik (locatie?)
- 5 blaasjes rond geslachtsdelen of anus
- 6 wratjes rond geslachtsdelen of anus
- 7 zweertjes rond geslachtsdelen of anus
- 8 keelklachten
- 9 koorts
- 10 ontstoken ogen
- 11 Pijn bij de anus
- 12 ulcus

Vrouwen

- 13 jeuk, locatie: _____
- 14 veranderde afscheiding
- 15 veranderde menstruatie
- 16 contactbloedingen na of bij het vrijen
- 17 anders: _____

Mannen

- 18 afscheiding uit penis
- 19 pijn/steken bijballen
- 20 anders: _____

10. Behoort u tot een groep met een risicofactor voor een SOA (zie onder)?

- Nee
- Ja, namelijk _____

En uw sekspartner?

- Nee
- Ja, namelijk _____

Risicofactoren zijn: MSM (mannen die seks hebben met mannen), jongeren t/m 25 jaar met wisselende contacten (≥ 3 gedurende de afgelopen zes maanden), swingers, prostitué(e)s of klanten van prostitué(e)s, personen afkomstig uit (Suriname, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Oost Europa), drugsgebruik, seksueel geweld/onvrijwillige seks.

12. Zijn er nog zaken die u zou willen toevoegen die niet gevraagd zijn?

Voor de assistente/huisarts

Welke testen moet u aanvragen?

Op basis van de door de patiënt aangegeven klachten (zie vraag 9) en gebruikte sekstechnieken (zie vraag 5a) kunt u via onderstaande schema bepalen wat er getest moet worden. Bij dit schema gaan wij ervanuit dat uw patiënt onveilige seks heeft gehad. Bij veilige seks is een test aanvragen niet nodig. Kijkt u bij het antwoord op vraag 1 om te beoordelen of u de patiënt op consult laat komen of doorverwijst naar Sense.

Het is erg belangrijk dat u de juiste locatie (vagina, urethra, anus, proctum en/of keel) test! Een schema hiervoor kunt u vinden op de website van Izore (Vademecum / SOA-set).

Risicogroep	nee	ja	ja	nee
Klachten	nee	nee	ja	ja of nee
	↓ Zie opmerking A.	↓ Zie opmerking B.	↓ Jongeren/swingers: Vraag onderzoek naar Chlamydia, GO aan. Overige risicogroepen of jongeren met partner uit risicogroep: Vraag onderzoek naar de BigFive* aan.	↓ Vraag onderzoek naar Chlamydia, GO aan.

A. Maak een inschatting van het SOA-risico en bespreek of testen nodig zijn. Afhankelijk van het antwoord op vraag 1 op consult laten komen of doorverwijzen naar Sense.

B. Maak een afweging op grond van afkomst en gedrag;

- Indien leeftijd < 25 jaar: bied laagdrempelig een chlamydiatetest aan.
- Bij een hoog SOA-risico (veel wisselende contacten, MSM, prostituee): test de Big Five* of verwijs naar de GGD. Bied MSM in ieder geval laagdrempelig een HIV-test aan, eventueel aangevuld met een hepatitis-B-test (indien niet gevaccineerd).
- Bied patiënten uit een HIV- en/of hepatitis B-endemisch gebied (zie vraag 10) laagdrempelig een HIV-test en/of een hepatitis-B-test aan;
- Overige patiënten: maak een inschatting van het SOA-risico en bespreek of testen nodig zijn.

* Big Five: Chlamydia-infectie, Gonorrhoe, Lues (Syphilis), hepatitis B (HBV) en HIV

Let op: bovenstaande onderzoeken dienen te worden aangevuld met specifieke diagnostische testen afhankelijk van de klachten:







Bij ulcus: denk aan Lues (Syphilis);

Bij genitale blaasjes of wratjes: testen op Herpes simplex (HSV);

Bij fluorklachten: testen op Trichomonas;

Bij jeuk: denk aan Candida.

Let op: Denk aan de partnerwaarschuwingen wanneer de testuitslag positief is.

 <h3 style="text-align: center;">SOA - Urine (♂)</h3> <p>Benodigd verzendmateriaal: verzendsetje SOA (C)</p> <p>Benodigd patiëntenmateriaal: urine eerste portie</p> <p>Te gebruiken voor: SOA PCR bij man (chlamydia, gonorrhoe, trichomonas)</p> <p>Bewaren tot gebruik: kamertemperatuur</p> <p>Bewaren tot transport: kamertemperatuur</p> <p>Opmerkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Voor zelfinstructies SOA-afname en voor schema andere testlocaties SOA-diagnostiek zie: www.izore.nl Voor rectum-, keeluitstrijk: zie tabblad "Uitstrijk algemeen"  <p style="font-size: small;">eerstelingspotje witte dop</p> 	 <h3 style="text-align: center;">SOA - ITM-wit (♀)</h3> <p>Benodigd verzendmateriaal: verzendsetje SOA (C)</p> <p>Benodigd patiëntenmateriaal: vagina-uitstrijk</p> <p>Te gebruiken voor: SOA PCR bij vrouw (chlamydia, gonorrhoe, trichomonas)</p> <p>Bewaren tot gebruik: kamertemperatuur</p> <p>Bewaren tot transport: kamertemperatuur max. 24 uur, anders in koelkast</p> <p>Opmerkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Voor zelfinstructies SOA-afname en voor schema andere testlocaties SOA-diagnostiek zie: www.izore.nl Voor rectum-, keeluitstrijk: zie tabblad "Uitstrijk algemeen"  <p style="font-size: small;">ITM-wit</p> 
---	--